

化学療法 治療スケジュール

病 名 結腸・直腸癌

レジメン登録番号


外科1

治療名 FOLFOX4 (フォルフォックス4)

お薬名	略語	投与時間	1日目	2日目	・	・	15日目	16日目	・	・
エルブラット	L-OHP	2時間			・	・			・	・
レボホリナート	l-LV	2時間			・	・			・	・
5-FU	5-FU	22時間			・	・			・	・
5-FU	5-FU	2~4分			・	・			・	・

※ 少なくとも12日間お休みし、繰り返します。

詳細



主な副作用 食欲不振、吐き気、嘔吐 治療中から起こることがあり1週間ほど続く場合があります。

白血球減少 注射後10日から14日が最も減少します。

末梢神経障害 冷たいものに触れたり飲食することで手足口のまわりのしびれや痛みを感じます。

下痢 回数が増えたり水様便が出ることがあります

倦怠感 だるくなったり力の抜けたような感じになることがあります

化学療法 治療スケジュール





病名 結腸・直腸癌

レジメン登録番号

外科13


治療名 mFOLFOX6

(mフォルフォックス6)

お薬名	略語	投与時間	1日目	2日目	・	・	15日目	16日目	・	・
エルプラット	L-OHP	2時間			・	・			・	・
レボホリナート	l-LV	2時間			・	・			・	・
5-FU	5-FU	46分			・	・			・	・
5-FU	5-FU	2~4分			・	・			・	・

※ 少なくとも12日間お休みし、繰り返します。

詳細



主な副作用 食欲不振、吐き気、嘔吐 治療中から起こることがあり1週間ほど続く場合があります。

白血球減少 注射後10日から14日が最も減少します。

末梢神経障害 冷たいものに触れたり飲食することで手足口のまわりのしびれや痛みを感じます

下痢 回数が増えたり水様便が出る場合があります

倦怠感 だるくなったり力の抜けたような感じになる場合があります

化学療法 治療スケジュール

病名 大腸癌

レジメン登録番号


外科2

治療名 FOLFIRI (フォルフィリ)

お薬名	略語	投与時間	1日目	2日目	・	・	15日目	16日目	・	・
トポテシン	CPT-11	1.5時間			・	・			・	・
レボホリナート	l-LV	2時間			・	・			・	・
5-FU	5-FU	46時間			・	・			・	・
5-FU	5-FU	2~4分			・	・			・	・

※ 少なくとも12日間お休みし、繰り返します。

詳細



主な副作用 下痢 回数が増えたり水様便が出ることがあります

食欲不振、吐き気、嘔吐 治療中から起こることがあり1週間ほど続く場合があります。

白血球減少 注射後10日から14日が最も減少します。

脱毛 治療が終われば数か月で生えてきます

倦怠感 だるくなったり力の抜けたような感じになることがあります

化学療法 治療スケジュール


病名 結腸・直腸癌 レジメン登録番号 外科11

治療名 FOLFOLX4+BV

お薬名	略語	投与時間	1日目	2日目	・	・	15日目	16日目	・	・
アバスタチン	BV	30分*1			・	・			・	・
エルプラット	L-OHP	2時間			・	・			・	・
レボホリナート	ℓ-LV	2時間			・	・			・	・
5-FU	5-FU	22時間			・	・			・	・
5-FU	5-FU	2~4分			・	・			・	・

※ 少なくとも12日間お休みし、繰り返します。

詳細



主な副作用 食欲不振、吐き気、嘔吐 治療中から起こることがあり1週間ほど続く場合があります。

白血球減少 注射後10日から14日が最も減少します。

末梢神経障害 冷たいものに触れたり飲食することで手足口のまわりのしびれや痛みを感じます。

下痢 回数が増えたり水様便が出ることがあります

倦怠感 だるくなったり力の抜けたような感じになることがあります。

出血 鼻、歯茎などから軽度の出血がみられることがあります。











化学療法 治療スケジュール

病 名 結腸・直腸癌

レジメン登録番号


外科14

治療名 mFOLFOX6+BV

お薬名	略語	投与時間	1日目	2日目	・	・	15日目	16日目	・	・
アバスタチン	BV	30分*1			・	・			・	・
エルプラット	L-OHP	2時間			・	・			・	・
レボホリナート	ℓ-LV	2時間			・	・			・	・
5-FU	5-FU	46時間			・	・			・	・
5-FU	5-FU	2~4分			・	・			・	・

※ 少なくとも12日間お休みし、繰り返します。

詳 細



*1 初回90分 2回目60分 3回目以降30分

主な副作用 血球減少、食欲不振、抹消神経障害、悪心、倦怠感、下痢など

出血 鼻、歯茎などから軽度の出血がみられることがあります。











化学療法 治療スケジュール

病 名 大腸癌

レジメン登録番号


外科12

治療名 FOLFIRI+BV

お薬名	略語	投与時間	1日目	2日目	・	・	15日目	16日目	・	・
アバスチン	BV	30分*1			・	・			・	・
トポテシン	CPT-11	1.5時間			・	・			・	・
レボホリナート	ℓ-LV	2時間			・	・			・	・
5-FU	5-FU	46時間			・	・			・	・
5-FU	5-FU	2~4分			・	・			・	・

※ 少なくとも12日間お休みし、繰り返します。

詳 細



*1 初回90分 2回目60分 3回目以降30分

主な副作用 下痢、悪心、嘔吐、血球減少、食欲不振、倦怠感など

出血 鼻、歯茎などから軽度の出血がみられることがあります。