病名 胃、大腸悪性リンパ腫 レジメン登録番号 消化器2

レジメン名(略語) CHOP

DAY

化学療法薬剤	《学療法薬剤名·略語		投与時間	投与方法	1	2	3	4	5
エンドキサン	СРМ	1000mg/m	2 ~ 3 h	Div					
アドリアシン	A D M	5 0 m g / m²	15 ~ 30 m	Div					
プレドニン	PSL	5 0 m g / m²	2 ~ 3 h	Div					
オンコビン	V C R	1.5mg/m²		IV					
プレドニン	PSL	5 0 m g / m²		PO					

1クール 3~4週間

総クール数 6クール

注意事項 前処置薬 カイトリル1A+生食100ml 15~30分

病名 膵がん レジメン登録番号 消化器1

レジメン名(略語) G E M

DAY

化学療法薬剤名·略語	1日投与量	投与時間	投与方法	1	•	8	•	15	•	22	•	29
ジェムザール	1000 ~ 1400mg	Div	正確に30分									

1クール 3週投与1週休薬 (2週投与2週休薬)

総クール数 無限

注意事項 前処置薬 カイトリル1A+生食100ml 15分

病名 結腸・直腸がん レジメン登録番号 外科1

レジメン名(略語) FOLFOX4

DAY

化学療法薬剤:	名·略語	1日投与量	投与時間	投与方法	1	2
エルプラット	L - OHP	8 5 m g / m²	2 h	Div		
アイソボリン	LV	100 m g / m²	2 h	Div		
5 - FU	5 - FU	600mg/m²	2 2 h	Div		
5 - FU	5 - FU	400mg/m²	2 ~ 4 m	iv		

詳細

1日目 2日目

側管

本管

エルプラット 85mg/㎡ 2時間持続点滴

100mg/m 5 - FU 600mg/m

アイソボリン 100mg/m 5-FU 600mg/m 2時間持続点滴 2時間持続点滴 22時間持続点滴 22時間持続点滴

> Bolus  $5 - FU = 400 \text{ mg/m}^2$

Bolus  $5 - FU + 400 \, \text{mg/m}^2$ 

少な〈とも13日間休薬し副作用の回復を待って反復投与 1クール

総クール数

注意事項 悪心、嘔吐、食欲不振等の消化器症状があらわれるので、5-HT3受容体拮抗薬、デキサメタゾン等の 前処置が推奨される。

> 手、足や口唇周囲部の感覚異常又は知覚不全、咽頭喉頭の絞扼があらわれるので異常が認められた 場合には、減量、休薬等の適切な処置を行うこと。

エルプラット投与数分以内の発疹、掻痒感

大腸がん 病名

レジメン登録番号 外科2

レジメン名(略語) FOLFIRI

DAY

化学療法薬	剤名·略語	1日投与量	投与時間	投与方法	1	2
トポテシン	C P T - 11	180mg/m²	1 . 5 h	Div		
アイソボリン	LV	200mg/m²	2 h	Div		
5 - FU	5 - FU	2400 ~ 3000 mg/m²	46h持続	Div		
5 - FU	5 - FU	400mg/m²	2 ~ 4 m	iv		

詳細

1日目 2日目

側管

トポテシン180mg/㎡ 1.5時間持続点滴

アイソボリン 100mg/㎡ 2時間持続点滴 5 - FU2400~3000mg/㎡ 46時間持続点滴

Bolus

 $5 - FU400mg/m^2$ 

2週間ごとに繰り返す 1クール

総クール数

注意事項

病名 非小細胞肺がん、乳が ん、胃がん

レジメン登録番号 外科4

レジメン名(略語) タキソール

化学療法薬剤名	略語	1日投与量	投与	投与方法	1	•	8	•	15	•	22	•	29
タキソール	PTX	80 mg/m²		Div									

1クール 3投1休

総クール数 4クール

注意事項 過飽和状態の薬剤が析出する恐れがあるためインラインフィルター使用すること

5%ブドウ糖液、生食以外とは混注しないこと。

病名 膵がん,非小細胞肺がん レジメン登録番号 外科7

レジメン名(略語) GEM

DAY

化学療法薬剤名·略語	1日投与量	投与時間	投与方法	1	•	8	•	15	•	22	•	29
ジェムザール	1000mg/m²	Div	30分									

1クール 3週投与1週休薬

総クール数

注意事項 溶解後の溶液を冷所にて保存すると結晶が析出おそれがあるため15度から30度で保存24時間以下

通常30分程度で投与。

病名

小細胞肺がん、非小細胞肺が ん、乳がん、結腸直腸がん

レジメン登録番号 外科8

レジメン名(略語) トポテシン

化学療法薬剤名·略語	吾	1日投与量	投与時間	投与方法	1	٠	8	•	15	•	22	•	29
トポテシン	C P T - 11	100mg/m²	Div										

1クール 3投2休

総クール数

注意事項

病名 胃がん、結腸直腸がん、

レジメン登録番号 外科9

レジメン名(略語) 5FUアイソボリン

(RPMI)

化学療法薬剤名·	略語	1日投与量	投与時間	投与方法
5 - FU	5 - FU	600mg/m²	3分以内緩徐	iv
アイソボリン	l - L V	250mg/m²	2時間	Div

1クール 6週投与2週休

総クール数

注意事項 アイソボリン開始1時間後に5-FUを3分以内で緩徐に静脈内注射。

病名 食道がん

レジメン登録番号 外科10

レジメン名(略語) lowdoseFP

化学療法薬剤名·	略語	1日投与量	投与時間	投与方法
5 - FU	5 - FU	160mg/m²		iv
ランダ	CDDP	3 m g / m²		Div

1クール 28日間連日投与7日間休

総クール数

注意事項