レジメン名	XP+Tmab（1コース目）
薬品名	カペシタビン＋シスプラチン+トラスツズマブ
一般名	カペシタビン+シスプラチン＋トラスツズマブ
対象疾患	切除不能進行・再発胃癌

作成日　2021.6.16
最終更新日　2021.6.16

day			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
投与スケジュール			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	休	休	休	休	休	休
シスプラチン	CDDP	80mg/㎡	★																				
カペシタビン	Cape	2000mg/㎡/日	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★						
トラスツズマブBS	Tmab	8mg/kg	★																				
カペシタビンはday1の夕食後からday15の朝食後まで服用																							

1日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
血管確保用				
Rp.2				120minでdiv
硫酸Mg補正液	20mL	8	mL	
テルモ生食 1L	1000mL	1	B	
★投与開始から3日間1日1L以上の飲水摂取				
Rp.3				10minでdiv
生理食塩液 50mL	50mL	1	B	
Rp.4				30minでdiv
プロイメンド点滴静注用150mg		1	V	
生理食塩液 100mL	100mL	1	B	
Rp.5				15minでdiv
アロキシ静注0.75mg	5mL	1	V	
デキサート注射液6.6mg	2mL	1	V	
デキサート注射液3.3mg	1mL	1	A	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
★day2-day4にデキサメタゾン8mgを服用				
カペシタビン：day1夕食後～day15朝食後				

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.6				90minでdiv
混注指示必須				
トラスツズマブBS注点滴静注用150mg			mg	
トラスツズマブBS注点滴静注用60mg			mg	
	8mg/kg			
注射用水20mL	20mL		mL	
生理食塩液250mL	250mL	1	B	
1Vあたり150mgは7.2mL、60mgは3.0mLの注射用水で溶解(21mg/mL)				
Rp.7				120minでdiv
シスプラチン注50mg	100mL		mg	
シスプラチン注10mg	20mL		mg	
	80mg/㎡			
生理食塩液500mL	500mL	1	B	
Rp.8				60minでdiv
ソルアセトF輸液 500mL	500mL	1	B	
Rp.9				60minでdiv
ソルアセトF輸液 500mL	500mL	1	B	
Rp.10				iv
フロセミド注20mg	2mL	1	A	
Rp.8開始と同時に側管からワンショット				

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間

まつもと医療センターがん化学療法チーム会・薬剤部 2020年4月