レジメン名	CAPOX+Tmab（2コース目-）
薬品名	カペシタビン＋オキサリプラチン+トラスツズマブ
一般名	カペシタビン+オキサリプラチン+トラスツズマブ
対象疾患	切除不能進行・再発胃癌

作成日 2021.6.18
最終更新日 2021.6.18

day			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
投与スケジュール			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	休	休	休	休	休	休
オキサリプラチン	L-OHP	130mg/㎡	★																				
カペシタビン	Cape	2000mg/㎡/日	★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★						
トラスツズマブBS	Tmab	6mg/kg	★																				
カペシタビンはday1の夕食後からday15の朝食後まで服用																							

1日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
血管確保用				
Rp.2				15minでdiv
アロキシ静注0.75mg	5mL	1	V	
デキサート注射液6.6mg	2mL	1	V	
デキサート注射液3.3mg	1mL	1	A	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
★day2-day3にデキサメタゾン8mgを服用				
カペシタビン：day1夕食後～day15朝食後				
Rp.3				30minでdiv
混注指示必須				
トラスツズマブBS注点滴静注用150mg			mg	
トラスツズマブBS注点滴静注用60mg			mg	
	6mg/kg			
注射用水20mL	20mL		mL	
生理食塩液250mL	250mL	1	B	
1Vあたり150mgは7.2mL、60mgは3.0mLの注射用水で溶解(21mg/mL)				

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.4				120minでdiv
オキサリプラチン点滴静注液100mg	20mL		mg	
オキサリプラチン点滴静注液50mg	10mL		mg	
	130mg/㎡			
5%ブドウ糖250mL	250mL	1	B	
Rp.5				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	15minでdiv

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間