

レジメンNo	血液NHL39	システム登録No	12039
レジメン名	GB(2-6コース目)	診療科	血液内科
薬品名	ガザイバ+トレアキシ		
一般名	オビヌツズマブ+ベンダムスチン		
対象疾患	濾胞性リンパ腫		

ページNo 1/2  
 作成日 2022.9.7  
 最終更新日 2023.2.7

day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
投与スケジュール	●	●	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休
ガザイバ	1000mg/body	★																										
トレアキシ	90mg/m <sup>2</sup>	★	★																									

1日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
血管確保用				
Rp.2				15minでdiv
グラニセトロン静注液3mg	3mL	1	A	
デキサート注射液6.6mg	2mL	1	V	
デキサート注射液3.3mg	1mL	1	A	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
★day3、day4にデキサメタゾン8mgを内服				
Rp.3				10minでdiv
混注指示必須				
CSTDを使用				
*トレアキシ点滴静注液100mg	4mL		mg	
	90mg/m <sup>2</sup>			
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.4				60minでdiv
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
★ガザイバ投与30分～60分前にコロナール1000mgを服用				
Rp.5				IV(側管)
ポラミン注5mg	1mL	1	A	
ガザイバ投与30分～60分前に投与				

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.6				
25mL/hの速度で点滴静注を開始し、30分毎に25mL/hずつ上げて、最大100mL/hまで(前回投与時に問題がなかった場合)				
●ガザイバ点滴静注1000mg	40mL	1000	mg	
	1000mg/body			
生理食塩液250mL	250mL	210	mL	
★前回投与時にIRRを認めた場合は投与60分以上前にデキサート注9.9mgを追加投与				
Rp.7				15minでdiv
生理食塩液50mL	50mL	1	B	

2日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
血管確保用				
Rp.2				15minでdiv
グラニセトロン静注液3mg	3mL	1	A	
デキサート注射液6.6mg	2mL	1	V	
デキサート注射液3.3mg	1mL	1	A	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
★day3、day4にデキサメタゾン8mgを内服				
Rp.3				10minでdiv
混注指示必須				
CSTDを使用				
*トレアキシ点滴静注液100mg	4mL		mg	
	90mg/m <sup>2</sup>			
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.4				15minでdiv
生理食塩液50mL	50mL	1	B	