

レジメンNo	血液NHL50	システム登録No	12050
レジメン名	G-CHOP(1コース目)	診療科	血液内科
薬品名	ガザイバ+エンドキサン+ドキシソルピシン+オンコビン+プレドニン		
一般名	オビヌツズマブ+シクロホスファミド+ドキシソルピシン+ビンクリスチン+プレドニゾロン		
対象疾患	濾胞性リンパ腫		

ページNo
作成日
最終更新日

1/2
2023.2.1
2023.2.1

day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
投与スケジュール	●	●	●	●	●	休	休	●	休	休	休	休	休	休	●	休	休	休	休	休	休
ガザイバ	1000mg/body	★						★							★						
エンドキサン	CPA 750mg/m ²	★																			
ドキシソルピシン	DXR 50mg/m ²	★																			
オンコビン	VCR 1.4mg/m ²	★																			
プレドニン	PSL 100mg/body	★	★	★	★	★															

1日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
血管確保用				
Rp.2				15minでdiv
パロノセトロン静注0.75mg	5mL	1	V	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
★アプレピタントカプセルの処方を確認してください				
Rp.3				120minでdiv
混注指示必須				
CSTDを使用				
注射用イントキサン500mg			mg	
注射用イントキサン100mg			mg	
	750mg/m ²			
生理食塩液250mL	250mL	1	B	
Rp.4				30minでdiv
*ドキシソルピシン塩酸塩注射液50mg	25mL		mg	
*ドキシソルピシン塩酸塩注射液10mg	5mL		mg	
	50mg/m ²			
生理食塩液100mL	100mL	1	B	

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.5				15minでdiv
*オンコビン注射用1mg			mg	
(最大2mg/body)	1.4mg/m ²			
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.6				60minでdiv
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
★ガザイバ投与30分～60分前にカロナール1000mgを服用				
Rp.7				IV(側管)
ポララミン注5mg	1mL	1	A	
ガザイバ投与30分～60分前に投与				
Rp.8				12mL/hの速度で点滴静注を開始し、30分毎に12mL/hずつ上げて、最大96mL/hまで
●ガザイバ点滴静注1000mg	40mL	1000	mg	
	1000mg/body			
生理食塩液250mL	250mL	210	mL	
★ガザイバ投与開始30分前までにプレドニンを服用				
Rp.9				15minでdiv
生理食塩液50mL	50mL	1	B	

8日目、15日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
血管確保用				
Rp.2				60minでdiv
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
★ガザイバ投与30分～60分前にカロナール1000mgを服用				
Rp.3				IV(側管)
ポララミン注5mg	1mL	1	A	
ガザイバ投与30分～60分前に投与				
Rp.4				25mL/hの速度で点滴静注を開始し、30分毎に25mL/hずつ上げて、最大100mL/hまで(前回投与時に問題がなかった場合)
混注指示必須				
●ガザイバ点滴静注1000mg	40mL	1000	mg	
	1000mg/body			
生理食塩液250mL	250mL	210	mL	
★前回投与時にIRRを認めた場合は投与60分以上前にデキサート注19.8mgを点滴静注				
Rp.5				15minでdiv
生理食塩液50mL	50mL	1	B	