

レジメンNo	血液NHL53	システム登録No	12053
レジメン名	[SD]G-CHOP(2-6コース目)	診療科	血液内科
薬品名 一般名 対象疾患	ガザイバ+エンドキサン+ドキシソルピシシン+オンコピン+プレドニン オビヌツズマブ+シクロホスファミド+ドキシソルピシシン+ビシクリスチン+プレドニゾロン 濾胞性リンパ腫		

ページNo
作成日
最終更新日

1/2
2023.2.1
2023.2.1

day			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
投与スケジュール			●	●	●	●	●	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休
ガザイバ		1000mg/body	★																				
エンドキサン	CPA	750mg/m ²	★																				
ドキシソルピシシ	DXR	50mg/m ²	★																				
オンコピン	VCR	1.4mg/m ²	★																				
プレドニン	PSL	100mg/body	★	★	★	★	★																

1日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間	薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間	薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1					Rp.5				15minでdiv					
生理食塩液50mL	50mL	1	B		*オンコピン注射用1mg				mg					
血管確保用					(最大2mg/body)				1.4mg/m ²					
					生理食塩液50mL	50mL	1	B						
Rp.2				15minでdiv	Rp.6				60minでdiv					
パロノセトロン静注0.75mg	5mL	1	V		生理食塩液100mL	100mL	1	B						
生理食塩液50mL	50mL	1	B		★ガザイバ投与30分～60分前にカロナール1000mgを服用									
★アプレピタントカプセルの処方を確認してください														
Rp.3				120minでdiv	Rp.7				IV(側管)					
混注指示必須					ポララミン注5mg	1mL	1	A						
CSTDを使用					ガザイバ投与30分～60分前に投与									
注射用イントキサン500mg			mg											
注射用イントキサン100mg			mg		Rp.8	25mL/hの速度で点滴静注を開始し、30分後以降225mL/hで投与可(前回投与時に問題がなかった場合)								
生理食塩液250mL	250mL	1	B		●ガザイバ点滴静注1000mg	40mL	1000	mg						
									1000mg/body					
					生理食塩液250mL	250mL	210	mL						
Rp.4				30minでdiv	★ガザイバ投与開始30分前までにプレドニンを服用									
*ドキシソルピシシ塩酸塩注射液50mg	25mL		mg											
*ドキシソルピシシ塩酸塩注射液10mg	5mL		mg		Rp.9				15minでdiv					
生理食塩液100mL	100mL	1	B		生理食塩液50mL	50mL	1	B						