

レジメンNo	血液NHL55	システム登録No	12055
レジメン名	[PCNSL]HD-MTX	診療科	血液内科
薬品名	メトトレキサート		
一般名	メトトレキサート		
対象疾患	中枢神経原発悪性リンパ腫		

ページNo  
作成日  
最終更新日

1/3  
2023.2.3  
2023.2.3

day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
投与スケジュール	●	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休
メトトレキサート	MTX	3500mg/m <sup>2</sup>	★											
ロイコボリン	LV	15mg/回	3	4	4									
LVは表の記載回数を6h毎に投与（MTXの血中濃度が0.1μmol/L未満になるまで継続）														
※リツキシマブ併用可(day0に投与)														

1日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1(メイン)①				4hでdiv
メイロン静注7% 20mL	20mL	1	A	0:00
ソルデム3A	500mL	1	B	
Rp.2(メイン)②				4hでdiv
メイロン静注7% 20mL	20mL	1	A	4:00
ソルデム3A	500mL	1	B	
Rp.3(メイン)③				4hでdiv
メイロン静注7% 20mL	20mL	1	A	8:00
ソルデム3A	500mL	1	B	
Rp.4(メイン)④				4hでdiv
メイロン静注7% 20mL	20mL	1	A	12:00
ソルデム3A	500mL	1	B	
Rp.5(メイン)⑤				4hでdiv
メイロン静注7% 20mL	20mL	1	A	16:00
ソルデム3A	500mL	1	B	
Rp.6(メイン)⑥				4hでdiv
メイロン静注7% 20mL	20mL	1	A	20:00
ソルデム3A	500mL	1	B	

2日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1(メイン)①				4hでdiv
メイロン静注7% 20mL	20mL	1	A	0:00
ソルデム3A	500mL	1	B	
Rp.2(メイン)②				4hでdiv
メイロン静注7% 20mL	20mL	1	A	4:00
ソルデム3A	500mL	1	B	
Rp.3(メイン)③				4hでdiv
メイロン静注7% 20mL	20mL	1	A	8:00
ソルデム3A	500mL	1	B	
Rp.4(メイン)④				4hでdiv
メイロン静注7% 20mL	20mL	1	A	12:00
ソルデム3A	500mL	1	B	
Rp.5(メイン)⑤				4hでdiv
メイロン静注7% 20mL	20mL	1	A	16:00
ソルデム3A	500mL	1	B	
Rp.6(メイン)⑥				4hでdiv
メイロン静注7% 20mL	20mL	1	A	20:00
ソルデム3A	500mL	1	B	

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.7(側管)①				15minでdiv
パロノセトロン静注0.75mg	5mL	1	V	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
★ダイアモックスの処方を確認してください				
Rp.8(側管)②				180minでdiv
混注指示必須				
メトトレキサート点滴静注液1000mg	40mL		mg	
メトトレキサート点滴静注液200mg	8mL		mg	
	3500mg/m <sup>2</sup>			
生理食塩液500mL	500mL	1	B	
Rp.9(側管)③				15minでdiv
生理食塩液50mL	50mL	1	B	

レジメンNo	血液NHL55	システム登録No	12055
レジメン名	<b>[PCNSL]HD-MTX</b>	診療科	血液内科
薬品名 一般名 対象疾患	<b>メトレキサート</b> メトレキサート 中枢神経原発悪性リンパ腫		

ページNo  
作成日  
最終更新日

2/3  
2023.2.3  
2023.2.3

day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
投与スケジュール	●	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休
メトレキサート	MTX	3500mg/m <sup>2</sup>	★											
ロイコボリン	LV	15mg/回		3	4	4								
LVは表の記載回数を6h毎に投与（MTXの血中濃度が0.1μmol/L未満になるまで継続）														
※リツキシマブ併用可(day0に投与)														

2日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.7(側管)①				iv
ロイコボリン注3mg	1mL	5	A	
MTX投与開始から24時間後				
Rp.8(側管)②				iv
ロイコボリン注3mg	1mL	5	A	
前回のロイコボリン投与から6時間後				
Rp.9(側管)③				iv
ロイコボリン注3mg	1mL	5	A	
前回のロイコボリン投与から6時間後				

3日目、4日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1(メイン)①				4hでdiv
メイロン静注7% 20mL	20mL	1	A	0:00
ソルデム3A	500mL	1	B	
Rp.2(メイン)②				4hでdiv
メイロン静注7% 20mL	20mL	1	A	4:00
ソルデム3A	500mL	1	B	
Rp.3(メイン)③				4hでdiv
メイロン静注7% 20mL	20mL	1	A	8:00
ソルデム3A	500mL	1	B	
Rp.4(メイン)④				4hでdiv
メイロン静注7% 20mL	20mL	1	A	12:00
ソルデム3A	500mL	1	B	
Rp.5(メイン)⑤				4hでdiv
メイロン静注7% 20mL	20mL	1	A	16:00
ソルデム3A	500mL	1	B	
Rp.6(メイン)⑥				4hでdiv
メイロン静注7% 20mL	20mL	1	A	20:00
ソルデム3A	500mL	1	B	

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.7(側管)①				iv
ロイコボリン注3mg	1mL	5	A	
前回のロイコボリン投与から6時間後				
Rp.8(側管)②				iv
ロイコボリン注3mg	1mL	5	A	
前回のロイコボリン投与から6時間後				
Rp.9(側管)②				iv
ロイコボリン注3mg	1mL	5	A	
前回のロイコボリン投与から6時間後				
Rp.10(側管)②				iv
ロイコボリン注3mg	1mL	5	A	
前回のロイコボリン投与から6時間後				