

レジメンNo	血液MM35	システム登録No	13035
レジメン名	EPd[50kg未満](1コース目)	診療科	血液内科
薬品名	エムプリシティ+ボマリスト+レナデックス(デキサート)		
一般名	エロツズマブ+ボマリドミド+デキサメタゾン		
対象疾患	多発性骨髄腫		

ページNo  
作成日  
最終更新日

1/3  
2020.8.31  
2020.8.31

day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
投与スケジュール	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	休	休	休	休	休	休
エムプリシティ	★							★							★							★						
デキサート	★							★							★							★						
ボマリスト (内服)	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★							
レナデックス (内服)	★							★							★							★						
(*75歳超え:デキサメタゾン内服8mg)																												

1日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
血管確保用				
Rp.2				15minでdiv
デキサート注射液6.6mg	2mL	1	V	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.3				IV
ファモチジン注射用20mg		1	A	
生理食塩液20mL	20mL	1	B	
Rp.4				60minでdiv
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
Rp.5	0-30min:30mL/h,30min-1h:60mL/h,1h以降:120mL/h			
混注指示必須				
●エムプリシティ点滴静注用400mg			mg	
●エムプリシティ点滴静注用300mg			mg	
	10mg/kg			
注射用水20mL	20mL		mL	
300mg:13mL/V、400mg:17mL/Vの注射用水で溶解(25mg/mL)				
生理食塩液250mL	250mL	150	mL	
150mLの生理食塩液液で希釈				

8日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
血管確保用				
Rp.2				15minでdiv
デキサート注射液6.6mg	2mL	1	V	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.3				IV
ファモチジン注射用20mg		1	A	
生理食塩液20mL	20mL	1	B	
Rp.4				60minでdiv
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
Rp.5	0-30min:180mL/h,30min以降:240mL/h			
混注指示必須				
●エムプリシティ点滴静注用400mg			mg	
●エムプリシティ点滴静注用300mg			mg	
	10mg/kg			
注射用水20mL	20mL		mL	
300mg:13mL/V、400mg:17mL/Vの注射用水で溶解(25mg/mL)				
生理食塩液250mL	250mL	150	mL	
150mLの生理食塩液液で希釈				
(前回投与時にinfusion reactionが認められなかった場合)				

レジメンNo	血液MM35	システム登録No	13035
レジメン名	EPd[50kg未満](1コース目)	診療科	血液内科
薬品名 一般名 対象疾患	<b>エムブリシティ+ポマリスト+レナデックス(デキサート)</b> エロツズマブ+ポマリドミド+デキサメタゾン 多発性骨髄腫		

ページNo  
作成日  
最終更新日

2/3  
2020.8.31  
2020.8.31

day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
投与スケジュール	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	休	休	休	休	休	休
エムブリシティ	★							★							★							★						
デキサート	★							★							★							★						
ポマリスト (内服)	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★							
レナデックス (内服)	★							★							★							★						
(※75歳超え：デキサメタゾン内服8mg)																												

15日目,22日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.6				15minでdiv
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
血管確保用				
Rp.2				15minでdiv
デキサート注射液6.6mg	2mL	1	V	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.3				IV
ファモチジン注射用20mg		1	A	
生理食塩液20mL	20mL	1	B	
Rp.4				60minでdiv
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
Rp.5				300mL/h
混注指示必須				
●エムブリシティ点滴静注用400mg			mg	
●エムブリシティ点滴静注用300mg			mg	
			10mg/kg	
注射用水20mL	20mL		mL	
300mg:13mL/V、400mg:17mL/Vの注射用水で溶解(25mg/mL)				
生理食塩液250mL	250mL	150	mL	
150mLの生理食塩液で希釈				
(前回投与時にin infusion reactionが認められなかった場合)				