レジメンNo	血液MM54	システム登録No	13054
レジメン名	[皮下]DVMP(1コース目)	診療科	血液内科
薬品名	ダラキューロ+ベルケイド+アルケラン+プレドニン		
一般名	ダラツムマブ+ボルテゾミブ+メルファラン+プレドニゾロン		
対象疾患	多発性骨髄腫		

ページNo 1/2
作成日 2021.6.21
最終更新日 2021.6.21

day			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
投与スケジュール			●	●	●	●	休	休	休	●	休	休	●	休	休	休	●	休	休	休	休	休	休	●	休	休	●	休	休	休	●	休	休	●	休	休	休	●	休	休	休	休	休	休
ダラキューロ		1800mg/body	★							★							★							★							★							★						
ベルケイド		1.3mg/㎡	★			★				★			★											★			★				★			★									
アルケラン（内服）	MEL	9mg/㎡	★	★	★	★																																					
プレドニン（内服）	PSL	60mg/㎡		★	★	★																																					
レナデックス（内服）	DEX	20mg/body	★							★							★							★							★							★						

1日目、8日目、22日目、29日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				3～5分でsc
混注指示必須				
ダラキューロ配合皮下注	15mL	15	mL	
	1800mg/body			
★ダラキューロ投与1～3時間前にレナデックス20mg、カロナール1000mg、オロパタジン10mgを服用				
Rp.2				sc
ベルケイド注射用3mg			mg	
	1.3mg/㎡			
生理食塩液20mL	20mL	1.2	mL	
1Vあたり1.2mLの生理食塩液で溶解(2.5mg/mL)				

4日目、11日目、25日目、32日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				sc
混注指示必須				
ベルケイド注射用3mg			mg	
	1.3mg/㎡			
生理食塩液20mL	20mL	1.2	mL	
1Vあたり1.2mLの生理食塩液で溶解(2.5mg/mL)				

15日目、36日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				3～5分でsc
混注指示必須				
ダラキューロ配合皮下注	15mL	15	mL	
	1800mg/body			
★ダラキューロ投与1～3時間前にレナデックス20mg、カロナール1000mg、オロパタジン10mgを服用				