

レジメンNo	血液ALL7	システム登録No	16007
レジメン名	プリナツモマブ(1コース目/45kg未満)	診療科	血液内科
薬品名	ビーリンサイト		
一般名	プリナツモマブ		
対象疾患	B細胞性急性リンパ性白血病		

ページNo  
作成日  
最終更新日

1/2  
2022.8.15  
2022.8.15

day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-	27	28	29	30	-	41	42
投与スケジュール	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	休	休	休	休	休
ビーリンサイト	★	★	★	★	★	★	★										
ビーリンサイト								★	★	★	★	★					

1日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				15minでdiv
デキサート注射液6.6mg	2mL	2	V	
デキサート注射液3.3mg	1mL	1	A	
ビーリンサイト投与前1時間以内に投与				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
★ビーリンサイトと別のルートで投与				
Rp.2				5mL/hでivh
混注指示必須				
●ビーリンサイト点滴静注用35μg		21.25	μg	
★適正使用ガイドの必要量確認表を基に投与量を入力(最大21.25μg)/薬剤師要確認				
注射用水20mL	20mL	3	mL	
3mL/Vの注射用水で溶解(12.5μg/mL)/輸液安定化液5.5mLを添加				
生理食塩液250mL		270	mL	
★48時間で交換(残液は薬剤部へ)/交換時のフラッシュ禁止				

3日目、5日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				5mL/hでivh
混注指示必須				
●ビーリンサイト点滴静注用35μg		21.25	μg	
★適正使用ガイドの必要量確認表を基に投与量を入力(最大21.25μg)/薬剤師要確認				
注射用水20mL	20mL	3	mL	
3mL/Vの注射用水で溶解(12.5μg/mL)/輸液安定化液5.5mLを添加				
生理食塩液250mL		270	mL	
★48時間で交換(残液は薬剤部へ)/交換時のフラッシュ禁止				

7日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				5mL/hでivh
混注指示必須				
●ビーリンサイト点滴静注用35μg		21.25	μg	
★適正使用ガイドの必要量確認表を基に投与量を入力(最大21.25μg)/薬剤師要確認				
注射用水20mL	20mL	3	mL	
3mL/Vの注射用水で溶解(12.5μg/mL)/輸液安定化液5.5mLを添加				
生理食塩液250mL		270	mL	
★24時間で交換(残液は薬剤部へ)/交換時のフラッシュ禁止				

8日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				15minでdiv
デキサート注射液6.6mg	2mL	2	V	
デキサート注射液3.3mg	1mL	1	A	
ビーリンサイト交換前1時間以内に投与				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
★ビーリンサイトと別のルートで投与				
Rp.2				10mL/hでivh
混注指示必須				
●ビーリンサイト点滴静注用35μg		32.5	μg	
★適正使用ガイドの必要量確認表を基に投与量を入力(最大32.5μg)/薬剤師要確認				
注射用水20mL	20mL	3	mL	
3mL/Vの注射用水で溶解(12.5μg/mL)/輸液安定化液5.5mLを添加				
生理食塩液250mL		270	mL	
★24時間で交換(残液は薬剤部へ)/交換時のフラッシュ禁止				

9-28日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				10mL/hでivh
混注指示必須				
●ビーリンサイト点滴静注用35μg		32.5	μg	
★適正使用ガイドの必要量確認表を基に投与量を入力(最大32.5μg)/薬剤師要確認				
注射用水20mL	20mL	3	mL	
3mL/Vの注射用水で溶解(12.5μg/mL)/輸液安定化液5.5mLを添加				
生理食塩液250mL		270	mL	
★24時間で交換(残液は薬剤部へ)/交換時のフラッシュ禁止				

29日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				iv
生理食塩液20mL	20mL	1	A	
ビーリンサイトのルート接続部をはずした後、可能な限り緩徐に投与				
Rp.2				iv
ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ	10mL	1	kit	