

レジメンNo	血液CLL3	システム登録No	17003
レジメン名	[CLL]BR(1コース目)	診療科	血液内科
薬品名	トレアキシシ+リツキサン		
一般名	ベンダムスチン+リツキシマブ		
対象疾患	慢性リンパ性白血病		

ページNo 1/2  
 作成日 2023.6.2  
 最終更新日 2023.6.2

day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
投与スケジュール	●	●	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休
トレアキシシ																												
リツキサン	R																											

1日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
血管確保用				
Rp.2				15minでdiv
グラニセトロン静注液3mg	3mL	1	A	
デキサート注射液6.6mg	2mL	1	V	
デキサート注射液3.3mg	1mL	1	A	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
★day3、day4にデキサメタゾン8mgを内服				
Rp.3				10minでdiv
混注指示必須				
CSTDを使用				
*トレアキシシ点滴静注液100mg	4mL		mg	
	90mg/m <sup>2</sup>			
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.4				15minでdiv
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
★リツキシマブBS投与30分前にカロナール500mgを服用				
Rp.5				IV(側管)
ポララミン注5mg	1mL	1	A	

2日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				30minでdiv
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
血管確保用				
Rp.2				15minでdiv
グラニセトロン静注液3mg	3mL	1	A	
デキサート注射液6.6mg	2mL	1	V	
デキサート注射液3.3mg	1mL	1	A	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
★day3、day4にデキサメタゾン8mgを内服				
Rp.3				10minでdiv
混注指示必須				
CSTDを使用				
*トレアキシシ点滴静注液100mg	4mL		mg	
	90mg/m <sup>2</sup>			
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.4				15minでdiv
生理食塩液50mL	50mL	1	B	

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.6				30minでdiv
ソル・コーテフ注射用100mg		1	V	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.7				50mL/hの速度で点滴静注を開始し、30分毎に50mL/hずつ上げて、最大400mL/hまで
リツキサン点滴静注500mg	50mL		mg	
リツキサン点滴静注100mg	10mL		mg	
	375mg/m <sup>2</sup>			
生理食塩液500mL	500mL		mL	
リツキサンの投与量(mL)×9倍の生理食塩液で希釈(1mg/mL)				
Rp.8				15minでdiv
生理食塩液50mL	50mL	1	B	