

レジメンNo	血液HSCT1	システム登録No	91001
レジメン名	LEED	診療科	血液内科
薬品名 一般名 対象疾患	デキサート+エンドキサン+エトポシド+アルケラン デキサメタゾン+シクロホスファミド+エトポシド+メルファラン 悪性リンパ腫自家移植前処置		

ページNo
作成日
最終更新日

1/3
2023.5.30
2023.5.30

day			-4	-3	-2	-1
投与スケジュール			●	●	●	●
デキサート	DEX	39.6mg/body	★	★	★	★
エンドキサン	CPA	60mg/kg	★	★		
エトポシド	VP-16	500mg/m ²	★	★	★	
アルケラン	MEL	130mg/m ²				★

-4、-3日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
血管確保用				
Rp.2				15minでivh
グラニセロン静注液3mg	3mL	1	A	
デキサート注射液6.6mg	2mL	6	V	
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
★アプレピタントカプセルの処方を確認してください				
Rp.3				30minでivh
ウロミテキサン注400mg			mg	
	24mg/kg			
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
エンドキサン投与30分前				
Rp.4				180minでivh
混注指示必須				
CSTDを使用				
注射用エンドキサン500mg			mg	
注射用エンドキサン100mg			mg	
	60mg/kg			
生理食塩液500mL	500mL	1	B	

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.5				30minでivh
ウロミテキサン注400mg			mg	
	24mg/kg			
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
エンドキサン開始4時間後				
Rp.6				30minでivh
ウロミテキサン注400mg			mg	
	24mg/kg			
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
エンドキサン開始8時間後				
Rp.7				120minでivh
エトポシド点滴静注液100mg	5mL		mg	
	125mg/m ²			
5%ブドウ糖液500mL	500mL	1	B	
★調製後10時間以内に投与を完了する				
エンドキサン投与終了後開始				
Rp.8				120minでivh
エトポシド点滴静注液100mg	5mL		mg	
	125mg/m ²			
5%ブドウ糖液500mL	500mL	1	B	
★調製後10時間以内に投与を完了する				

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.9				120minでivh
エトポシド点滴静注液100mg	5mL		mg	
	125mg/m ²			
5%ブドウ糖液500mL	500mL	1	B	
★調製後10時間以内に投与を完了する				
Rp.10				120minでivh
エトポシド点滴静注液100mg	5mL		mg	
	125mg/m ²			
5%ブドウ糖液500mL	500mL	1	B	
★調製後10時間以内に投与を完了する				
Rp.11				30minでivh
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
Rp.12				iv
ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ	10mL	1	kit	

レジメンNo	血液HSCT1	システム登録No	91001
レジメン名	LEED	診療科	血液内科
薬品名 一般名 対象疾患	デキサート+エンドキサン+エトポシド+アルケラン デキサメタゾン+シクロホスファミド+エトポシド+メルファラン 悪性リンパ腫自家移植前処置		

ページNo
作成日
最終更新日

2/3
2023.5.30
2023.5.30

day			-4	-3	-2	-1
投与スケジュール			●	●	●	●
デキサート	DEX	39.6mg/body	★	★	★	★
エンドキサン	CPA	60mg/kg	★	★		
エトポシド	VP-16	500mg/m ²	★	★	★	
アルケラン	MEL	130mg/m ²				★

-2日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
血管確保用				
Rp.2				15minでivh
グラニセトロン静注液3mg	3mL	1	A	
デキサート注射液6.6mg	2mL	6	V	
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
Rp.3				120minでivh
混注指示必須				
エトポシド点滴静注液100mg	5mL		mg	
	125mg/m ²			
5%ブドウ糖液500mL	500mL	1	B	
★調製後10時間以内に投与を完了する				
Rp.4				120minでivh
エトポシド点滴静注液100mg	5mL		mg	
	125mg/m ²			
5%ブドウ糖液500mL	500mL	1	B	
★調製後10時間以内に投与を完了する				

-1日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.5				120minでivh
エトポシド点滴静注液100mg	5mL		mg	
	125mg/m ²			
5%ブドウ糖液500mL	500mL	1	B	
★調製後10時間以内に投与を完了する				
Rp.6				120minでivh
エトポシド点滴静注液100mg	5mL		mg	
	125mg/m ²			
5%ブドウ糖液500mL	500mL	1	B	
★調製後10時間以内に投与を完了する				
Rp.7				30minでivh
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
Rp.8				iv
ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ	10mL	1	kit	
★調製後90分以内に投与を完了する フィルター使用不可 クライオセラピーの指示を確認 アルケラン投与前日から投与後24時間は 2000mL/日以上補液を				