

| | | | |
|--------|---------------------------|----------|-------|
| レジメンNo | 血液HSCT11 | システム登録No | 91011 |
| レジメン名 | FLU+BU(4)+TBI(投与体重70kg以上) | 診療科 | 血液内科 |
| 薬品名 | フルダラ+ブスルフェクス(+全身放射線照射) | | |
| 一般名 | フルダラビン+ブスルファン(+全身放射線照射) | | |
| 対象疾患 | 同種移植前処置 | | |

ページNo
作成日
最終更新日

1/3
2023.6.2
2023.6.2

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----|---------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| day | | | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 |
| 投与スケジュール | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 休 | 休 |
| フルダラ | FLU | 30mg/m ² | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | | |
| ブスルフェクス | BU | 3.2mg/kg | | ★ | ★ | ★ | ★ | | | |

-8日目

| 薬剤名・用法 | 規格・容量 | 数量 | 単位 | 投与時間 |
|--|---------------------|----|-----|-----------|
| Rp.1 | | | | |
| 生理食塩液100mL | 100mL | 1 | B | |
| 血管確保用 | | | | |
| Rp.2 | | | | 15minでivh |
| グラニセトロン静注液3mg | 3mL | 1 | A | 9:45 |
| 生理食塩液50mL | 50mL | 1 | B | |
| Rp.3 | | | | 30minでivh |
| 混注指示必須 10:00 | | | | |
| フルダラ静注用50mg | | | mg | |
| | 30mg/m ² | | | |
| 注射用水20mL | 20mL | | mL | |
| 2.5mL/Vの注射用水で溶解(20mg/mL) | | | | |
| 生理食塩液100mL | 100mL | 1 | B | |
| CCr20~47mL/分/m ² の場合は次式に基づいて投与量を決定 投与量[mg]=30×(0.4+0.01×CCr[mL/分/m ²])×BSA | | | | |
| Rp.4 | | | | 30minでivh |
| 生理食塩液100mL | 100mL | 1 | B | 10:30 |
| Rp.5 | | | | iv |
| ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ | 10mL | 1 | kit | |

-7~-4日目

| 薬剤名・用法 | 規格・容量 | 数量 | 単位 | 投与時間 |
|--|---------------------|----|----|-----------|
| Rp.1 | | | | |
| 生理食塩液100mL | 100mL | 1 | B | |
| 血管確保用 | | | | |
| Rp.2 | | | | 15minでivh |
| グラニセトロン静注液3mg | 3mL | 1 | A | 9:45 |
| 生理食塩液50mL | 50mL | 1 | B | |
| Rp.3 | | | | 30minでivh |
| 混注指示必須 10:00 | | | | |
| フルダラ静注用50mg | | | mg | |
| | 30mg/m ² | | | |
| 注射用水20mL | 20mL | | mL | |
| 2.5mL/Vの注射用水で溶解(20mg/mL) | | | | |
| 生理食塩液100mL | 100mL | 1 | B | |
| CCr20~47mL/分/m ² の場合は次式に基づいて投与量を決定 投与量[mg]=30×(0.4+0.01×CCr[mL/分/m ²])×BSA | | | | |
| Rp.4 | | | | 30minでivh |
| 生理食塩液100mL | 100mL | 1 | B | 10:30 |

| 薬剤名・用法 | 規格・容量 | 数量 | 単位 | 投与時間 |
|--|----------|----|-----|------------|
| Rp.5 | | | | 180minでivh |
| *ブスルフェクス点滴静注用60mg | 10mL | | mg | 11:00 |
| | 3.2mg/kg | | | |
| 生理食塩液500mL | 500mL | | mL | |
| ブスルフェクスの投与量(mL)×10倍の生理食塩液で希釈 ★調製後8時間以内に投与を完了する ★レベチラセタムの処方を確認(day-9~day-2) | | | | |
| Rp.6 | | | | 30minでivh |
| 生理食塩液100mL | 100mL | 1 | B | 14:00 |
| Rp.7 | | | | iv |
| ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ | 10mL | 1 | kit | |

