

レジメンNo	血液O3	システム登録No	92003
レジメン名	[皮下]DCyBorD(3-6コース目)	診療科	血液内科
薬品名 一般名 対象疾患	<p style="text-align: center;">ダラキューロ+エンドキサン+ベルケイド+レナデックス ダラツムマブ+シクロホスファミド+ボルテゾミブ+デキサメタゾン 全身性ALアミロイドーシス</p>		

ページNo
作成日
最終更新日

1/2
2023.3.3
2023.3.3

day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
投与スケジュール	●	●	休	休	休	休	休	●	●	休	休	休	休	休	●	●	休	休	休	休	休	●	●	休	休	休	休	休
ダラキューロ	★														★													
エンドキサン (内服)	★							★							★								★					
ベルケイド	★							★							★								★					
レナデックス (内服)	★	★													★	★												
レナデックス (内服)	★							★															★					

(※70歳を越える、過小体重、血流量増加症、コントロール不良のDM、又はステロイド療法に対する忍容性がない若しくは有害事象を発現した患者にはデキサメタゾン20mg/weekも可)

1日目、15日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				3~5分でsc
混注指示必須				
ダラキューロ配合皮下注	15mL	15	mL	
	1800mg/body			
★ダラキューロ投与1~3時間前にレナデックス20mg、カロナール1000mg、オロパタジン10mgを服用				
エンドキサン錠/5-HT3受容体拮抗薬の処方を確認				
Rp.2				sc
ベルケイド注射用3mg			mg	
	1.3mg/m ²			
生理食塩液20mL	20mL	1.2	mL	
1Vあたり1.2mLの生理食塩液で溶解(2.5mg/mL)				

8日目、22日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				sc
混注指示必須				
ベルケイド注射用3mg			mg	
	1.3mg/m ²			
生理食塩液20mL	20mL	1.2	mL	
1Vあたり1.2mLの生理食塩液で溶解(2.5mg/mL)				
レナデックス錠/エンドキサン錠/5-HT3受容体拮抗薬の処方を確認				

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間