| レジメンNo | 消化器GC27 | システム登録No | 21027/31027 |
|---|---|---|---|
| レジメン名 | SOX+ニボルマブ | 診療科 | 外科/消化器内科 |
| 薬品名 | エスワンタイホウ＋オキサリプラチン+オプジーボ | | |
| 一般名 | テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤+オキサリプラチン+ニボルマブ | | |
| 対象疾患 | HER2陰性切除不能進行・再発胃癌 | | |


作成日 2022.12.22
最終更新日 2023.2.7

| day | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投与スケジュール | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| オキサリプラチン | L-OHP | 130mg/㎡ | ★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| エスワンタイホウ | S-1 | 80～120mg/日 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | | | | | | |
| ニボルマブ | | 360mg/body | ★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| エスワンタイホウはday1の夕食後からday15の朝食後まで服用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1日目

| 薬剤名・用法 | 規格・容量 | 数量 | 単位 | 投与時間 |
|---|---|---|---|---|
| Rp.1 | | | | |
| 生理食塩液50mL | 50mL | 1 | B | |
| 血管確保用 | | | | |
| | | | | |
| Rp.2 | | | | 30minでdiv |
| 混注指示必須 | | | | |
| ●オプジーボ点滴静注240mg | 24mL | 240 | mg | |
| ●オプジーボ点滴静注100mg | 10mL | 100 | mg | |
| ●オプジーボ点滴静注20mg | 2mL | 20 | mg | |
| | 360mg/body | | | |
| 生理食塩液100mL | 100mL | 64 | mL | |
| 全量100mLとなるように生理食塩液で希釈 | | | | |
| | | | | |
| Rp.3 | | | | 30minでdiv |
| 生理食塩液100mL | 100mL | 1 | B | |
| | | | | |
| Rp.4 | | | | 15minでdiv |
| パロノセトロン静注0.75mg | 5mL | 1 | V | |
| デキサート注射液6.6mg | 2mL | 1 | V | |
| デキサート注射液3.3mg | 1mL | 1 | A | |
| 生理食塩液50mL | 50mL | 1 | B | |
| ★day2-day3にデキサメタゾン8mgを服用 | | | | |
| S-1：day1夕食後～day15朝食後 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 薬剤名・用法 | 規格・容量 | 数量 | 単位 | 投与時間 |
|---|---|---|---|---|
| Rp.5 | | | | 120minでdiv |
| *オキサリプラチン点滴静注液100mg | 20mL | | mg | |
| *オキサリプラチン点滴静注液50mg | 10mL | | mg | |
| | 130mg/㎡ | | | |
| 5%ブドウ糖250mL | 250mL | 1 | B | |
| | | | | |
| Rp.6 | | | | 15minでdiv |
| 生理食塩液50mL | 50mL | 1 | B | |

| 薬剤名・用法 | 規格・容量 | 数量 | 単位 | 投与時間 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |