

レジメンNo	消化器PC1	システム登録No	22001/32001
レジメン名	<b>FOLFIRINOX</b>	診療科	外科/消化器内科
薬品名	<b>イリノテカン+オキサリプラチン+レボホリナート+フルオロウラシル</b>		
一般名	イリノテカン+オキサリプラチン+レボホリナートカルシウム+フルオロウラシル		
対象疾患	切除不能膵臓癌		

ページNo  
作成日  
最終更新日

1/2  
2021.7.16  
2023.2.7

day			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
投与スケジュール			●	●	●	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休
イリノテカン	CPT-11	180mg/m <sup>2</sup>	★													
オキサリプラチン	L-OHP	85mg/m <sup>2</sup>	★													
レボホリナート	I-LV	200mg/m <sup>2</sup>	★													
フルオロウラシル	5-FU	400mg/m <sup>2</sup>	★													
フルオロウラシル	5-FU	2400mg/m <sup>2</sup>	46時間													

### 1日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
血管確保用				
Rp.2				30minでdiv
プロイメド点滴静注用150mg		1	V	
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
Rp.3				30minでdiv
アロキシ静注0.75mg	5mL	1	V	
デキサート注射液6.6mg	2mL	1	V	
デキサート注射液3.3mg	1mL	1	A	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
★day4にデキサメタゾン8mgを内服				
Rp.4				120minでdiv
混注指示必須				
*オキサリプラチン点滴静注100mg	20mL		mg	
*オキサリプラチン点滴静注50mg	10mL		mg	
	85mg/m <sup>2</sup>			
5%ブドウ糖250mL	250mL	1	B	

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.5				120minでdiv
レボホリナート点滴静注用100mg			mg	
レボホリナート点滴静注用25mg			mg	
	200mg/m <sup>2</sup>			
5%ブドウ糖250mL	250mL	1	B	
Rp.6 (Rp.5の側管)				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
側管のルート確保用				
Rp.7 (Rp.5の側管)				90minでdiv
イリノテカン点滴静注100mg	5mL		mg	
イリノテカン点滴静注40mg	2mL		mg	
	180mg/m <sup>2</sup>			
5%ブドウ糖液250mL	250mL	1	B	
★レボホリナート投与開始30分後から投与開始				
Rp.8				全開でdiv
フルオロウラシル注1000mg	20mL		mg	
フルオロウラシル注250mg	5mL		mg	
	400mg/m <sup>2</sup>			
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
レボホリナート終了後				

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.9				46hでdiv
フルオロウラシル注1000mg	20mL		mg	
フルオロウラシル注250mg	5mL		mg	
	2400mg/m <sup>2</sup>			
生理食塩液500mL	500mL	1	B	

### 2日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				15minでdiv
デキサート注射液6.6mg	2mL	1	V	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	

### 3日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				15minでdiv
デキサート注射液6.6mg	2mL	1	V	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.2				30minでdiv
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
フルオロウラシル終了後				