レジメンNo	外科CC26	システム登録No	24026
レジメン名	CAPIRI＋Bmab	診療科	外科
薬品名	ベバシズマブBS+イリノテカン＋カペシタビン		
一般名	ベバシズマブ+イリノテカン＋カペシタビン		
対象疾患	切除不能結腸・直腸癌		

ページNo 1/2
作成日 2021.4.21
最終更新日 2021.4.21

day			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
投与スケジュール			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	休	休	休	休	休	休
イリノテカン	CPT-11	200mg/㎡	★																				
カペシタビン	Cape	1600mg/㎡/日	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★						
ベバシズマブBS	Bmab	7.5mg/kg	★																				
カペシタビンはday1の夕食後からday15の朝食後まで服用																							

1日目、15日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
血管確保用				
Rp.2				15minでdiv
アロキシ静注0.75mg	5mL	1	V	
デキサート注射液6.6mg	2mL	1	V	
デキサート注射液3.3mg	1mL	1	A	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
day2,day3にデキサメタゾン8mgを内服				
カペシタビン：day1夕食後～day15朝食後				
Rp.3	初回は90minでdiv、2回目60minでdiv			
混注指示必須	3回目以降は30minでdiv可			
ベバシズマブBS点滴静注400mg	16mL		mg	
ベバシズマブBS点滴静注100mg	4mL		mg	
	7.5mg/kg			
生理食塩液100mL		1	B	
Rp.4				90minでdiv
イリノテカン点滴静注液100mg	5mL		mg	
イリノテカン点滴静注液40mg	2mL		mg	
	200mg/㎡			
5%ブドウ糖250mL	250mL	1	B	

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.5				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	15minでdiv

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間

まつもと医療センターがん化学療法チーム会・薬剤部 2020年4月