| レジメンNo | 外科BC11 | システム登録No | 26011 |
|---|---|---|---|
| レジメン名 | DTX | 診療科 | 外科 |
| 薬品名 | ドセタキセル | | |
| 一般名 | ドセタキセル | | |
| 対象疾患 | 乳癌 | | |

ページNo 1/2
作成日 2022.12.2
最終更新日 2022.12.2

| day | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投与スケジュール | | | ● | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| ドセタキセル | DTX | 75mg/㎡ | ★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1日目

| 薬剤名・用法 | 規格・容量 | 数量 | 単位 | 投与時間 |
|---|---|---|---|---|
| Rp.1 | | | | |
| 生理食塩液50mL | 50mL | 1 | B | |
| 血管確保用 | | | | |
| | | | | |
| Rp.2 | | | | 15minでdiv |
| デキサート注射液6.6mg | 2mL | 1 | A | |
| 生理食塩液50mL | 50mL | 1 | B | |
| day0、day2、day3にデキサメタゾン8mg内服を検討 | | | | |
| | | | | |
| Rp.3 | | | | 60minでdiv |
| 混注指示必須 | | | | |
| *ドセタキセル点滴静注液80mg | 4mL | | mg | |
| *ドセタキセル点滴静注液20mg | 1mL | | mg | |
| | 75mg/㎡ | | | |
| 5%ブドウ糖液250mL | 250mL | 1 | B | |
| | | | | |
| Rp.4 | | | | 15minでdiv |
| 生理食塩液50mL | 50mL | 1 | B | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 薬剤名・用法 | 規格・容量 | 数量 | 単位 | 投与時間 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 薬剤名・用法 | 規格・容量 | 数量 | 単位 | 投与時間 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |